

VACUNAS COVID-19

Enfermería Padre Manyanet



ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN

Tras la autorización de la vacuna AstraZeneca en la UE, se ha decidido realizar una estrategia de vacunación.

Actualmente en España existen tres tipos de vacunas autorizadas, Pfizer, Moderna y AstraZeneca.

Las tres vacunas anteriores presentan diferentes características, por ello, se han de administrar adecuadamente al perfil que requiere cada vacuna.

Las vacunas deben ser administradas a los perfiles de población en las que hayan sido ensayadas, no por esto, significa que no sean seguras.

Las tres, han demostrado niveles adecuados de eficacia y seguridad.

Pero de momento, la disponibilidad de las vacunas autorizadas es insuficiente para alcanzar rápidamente un acceso universal de las mismas.

Por tanto, teniendo en cuenta la situación epidemiológica actual, se ha decidido establecer un orden prioritario de vacunación en la población.

Priorización de vacunación en función de criterios éticos

Enfermería Padre Manyanet


La priorización se ha realizado en función de criterios éticos y de la evidencia científica.

Por lo tanto, la vacunación se va dirigir a personas vulnerables, con mayor riesgo de exposición y de transmisión a otras personas.

Las vacunas disponibles se utilizarán de manera simultánea.

Las de ARNm, conocidas como Pfizer y Moderna serán utilizadas para las personas más vulnerables.

La llamada vacuna Aztrazeneca se administrará a personas menores de 55 años y que no tengan enfermedades graves. Ya que no cuentan con datos de utilización en personas mayores de la edad indicada anteriormente.



SARS-CoV-2



“La priorización se ha realizado en función de criterios éticos y de la evidencia científica, dirigiendo la vacunación a las personas más vulnerables y con mayor riesgo de exposición y de transmisión a otras personas”



Evaluando los riesgos de exposición, transmisión, morbilidad y mortalidad, la vacunación se centrará en aquellos que pueda verse su salud gravemente comprometida.

Grupos de población a vacunar

Enfermería Padre Manyanet

Grupo 1: Residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en residencias de personas mayores y de atención a grandes dependientes

Grupo 2: Personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario

Grupo 4: Personas consideradas como grandes dependientes (grado III de dependencia, es decir, con necesidad de intensas medidas de apoyo) que no estén actualmente institucionalizadas

Grupo 5: Personas de 80 y más años (nacidas en 1941 y en años anteriores).

Grupo 3: Otro personal sanitario y sociosanitario

Grupo 3. A: Personal de ámbito hospitalario, de atención primaria.


Personal de odontología, higiene dental y otro personal sanitario que atiende de forma habitual a pacientes sin mascarilla y durante un tiempo superior a 15 minutos.

Grupo 3. B: Personal de los servicios de salud pública implicado en la gestión y respuesta a la pandemia

Personal sanitario y sociosanitario no vacunado con anterioridad.

Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, personal de oficinas de farmacia, protésicos dentales, logopedas y personal de psicología clínica.

Trabajadores de instituciones penitenciarias (IIPP).



Grupo 6 (6B y 6C): Docentes y personal de educación infantil, primaria y secundaria y necesidades educativas especiales

Grupo 6: Colectivos en activo con una función esencial para la sociedad



Grupo 6. A: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Emergencias y Fuerzas Armadas. Incluye Guardia Civil, Policía Nacional, Autonómica y Local, Bomberos, técnicos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, profesionales de Protección civil, Emergencias y Fuerzas Armadas.

Grupo 6. B: Docentes y personal de educación infantil y necesidades educativas especiales, incluyendo tanto docentes como otros profesionales que atienden al alumnado.

Grupo 6. C: Docentes y personal de educación primaria y secundaria.

¿QUÉ VACUNA ME VAN A PONER?

La vacunación se realizará de manera simultánea con Pfizer, Moderna y AstraZeneca según se vaya disponiendo de dosis.

La vacuna de AstraZeneca se recomienda su utilización en personas entre 18 y 55 años, excepto aquellas con inmunodepresión grave (incluyendo cáncer en tratamiento quimioterápico),

enfermedad cardiovascular no controlada y enfermedad hepática, renal, metabólica/endocrina o neurológica graves.



Las personas con las patologías anteriormente mencionadas y aquellas mayores de 56 años se vacunarán más adelante cuando les corresponda por grupo de edad y/o condición de riesgo con la vacuna más indicada en función de la disponibilidad de vacunas y la nueva evidencia disponible.

Por lo tanto, la utilización de la vacuna AstraZeneca ira dirigida a las personas de hasta 55 años de los siguientes grupos:

Grupo 3. B: Personal de los servicios de salud pública implicado en la gestión y respuesta a la pandemia

Personal de los servicios de salud pública implicado en la gestión y respuesta a la pandemia que no se haya vacunado en el grupo 2 (**grupo 3B**).

Servicios de inspección sanitaria, medicina legal y forense, consultas médicas privadas, servicios de ayuda a domicilio, centros de menores y centros de día o equivalentes, así como estudiantes sanitarios



y sociosanitarios que realicen prácticas clínicas (**grupo 3B**).

“Los mayores de 55 años se vacunarán más adelante, aunque les tocasse ahora por su profesión”

Enfermería Padre Manyanet

La pauta de vacunación será de **dos dosis** con una separación entre dosis entre **10 y 12 semanas**.

Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, personal de oficinas de farmacia, protésicos dentales, logopedas y personal de psicología clínica (**grupo 3B**).

Grupo 6. Colectivos con una función esencial para la sociedad

Grupo 6. B: Docentes de educación infantil

Grupo 6. C: Docentes de educación primaria y secundaria



Los profesores se vacunan

Enfermería Padre Manyanet

Colectivo con función esencial para la sociedad



Los profesores un colectivo con una función esencial para la sociedad

SE RECOMIENDA SEGUIR UTILIZANDO VACUNAS DE ARNM

Se recomienda seguir utilizando vacunas de ARNm para los siguientes grupos:

Grupo 1, grupo 2, grupo 3. A, grupo 4 y grupo 5.

Vacunación de personas con infección por SARS-CoV-2

Personas de hasta 55 años sin factores de riesgo y que en los últimos 6 meses les hayan diagnosticado covid, se vacunarán dentro de 6 meses.

Personas de hasta 55 años sin factores de riesgo y que hayan sido diagnosticados de covid hace más de 6 meses les corresponde la vacuna.

Si hay contagio después de la primera dosis se retrasa 6 meses la segunda dosis.

No se recomienda la realización de pruebas serológicas antes de la vacunación.



- Hasta la fecha los datos de laboratorio apuntan a que las actuales vacunas inducen respuestas de anticuerpos que mantienen su capacidad neutralizante frente a las nuevas variantes
- Si por motivos de desabastecimiento o similares, se retrasa la administración de la segunda dosis más allá del intervalo recomendado entre dosis, no se invalida la dosis puesta. “Dosis puesta dosis que cuenta”.
- La segunda dosis se administrará cuanto antes tras el día recomendado de la segunda dosis (21 días en la de Pfizer, 28 días en la vacuna de Moderna y entre 10 y 12 semanas en la vacuna de AstraZeneca).
- En el caso de residentes y grandes dependientes en los que hay varios tutores legales que no están de acuerdo en cuanto a la vacunación, prevalecerá la decisión que la ciencia apoya como mejor opción para estas personas, que es la vacunación, salvo que haya algún motivo clínico que justifique no hacerlo.
- Se garantizará la vacunación de todas las personas independientemente del nivel de aseguramiento (mutualidades).
- La vacunación frente a COVID-19 no es obligatoria. Como se indicaba en la Actualización 1 de la Estrategia, se considera importante registrar los casos de rechazo a la vacunación en el Registro de vacunación, con la finalidad de conocer las posibles razones de reticencia en diferentes grupos de población.

Bibliografía

Moreno Pérez D., García Rojas A.J., Urbiztondo Perdices L.C., Lluch Rodrigo J.A., Pastor Villalba E., Taboada Rodríguez J.A., M.D., Lasheras Carbajo Pérez Martín J.J. & Axpe A. (2021). Estrategia de vacunación frente a Covid-19 en España. [Dataset]. Versión de 9 de febrero de 2021. COVID-19_Actualizacion3_EstrategiaVacunacion.pdf (mscbs.gob.es)